

# Vođenje HOPB za vrijeme COVID 19 pandemije



Dr Muamer Dervišević  
Respiratorno udruženje u Bosni i Hercegovini

Stručni skup „Najbolja pulmološka praksa u vezi sa COVID19  
SARAJEVO, 24.02.2022.

# Uvod


- U svijetu 384 miliona ljudi boluje od HOPB
- Svake godine od posljedica HOPB umre 3 mil ljudi
- HOPB je trenutno TREĆI uzrok mortaliteta globalno, sa tendencijom rasta
- HOPB se može prevenirati, što ne iziskuje dodatne resurse

Pacijenti oboljeli od HOPB imaju veću mogućnost za razvoj teže kliničke slike pneumonije i ishod je gori.

Potencijalni razlog leži u tome što


1. Pacijenti sa HOPB imaju manje rezerve

2. Pacijenti sa HOPB imaju veću ekspresiju ACE2 receptora



# COVID 19 vs HOPB


- Pacijenti sa HOPB i COVID 19 imaju dispneu i otežano disanje
- Pored navedenih, pacijenti sa COVID 19 razvijaju opšti infektivni sindrom



# Dijagnoza HOPB u vrijeme COVID 19 pandemije


- Spirometrija sa bronhodilatatorom zlatni standard, ali procedura je pogodna za širenje virusa!
- Spirometriju ograničiti ISKLJUČIVO kod pacijenata kojima je PFT ključna u određivanju terapije, uz poštivanje zaštitnih mjera u sobama sa negativnim pritiskom i razlikom između pacijenata od 20 min do 3 sata.

# Terapija stabilne bolesti



# Terapija akutne egzacerbacije HOPB

- Ne odlagati terapiju sa kortikosteroidima
- Izbjegavati nebulizatore!



# Plućna rehabilitacija





Hvala na pažnji!